

Surveillance des fourmis envahissantes sur les zones à risques du site industriel de PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA



Suivi N° 27 (mai 2022) RAPPORT D'EXPERTISE

Réalisé pour PRONY RESOURCES New Caledonia SAS



RAVARY ECO-CONSULTANT

Surveillance des fourmis envahissantes sur les zones à risques du site industriel de Prony Resources NEW-CALEDONIA, à Prony

Mai 2022

RAVARY ECO-CONSULTANT

Introduction	- 1 -
Zones concernées par la campagne d'échantillonnage.....	- 2 -
Protocole utilisé.....	- 3 -
Résultats	- 5 -
<i>Occupation générale des appâts</i>	- 6 -
<i>Diversité et occurrence des espèces détectées</i>	- 6 -
Discussion et recommandations.....	- 9 -
Bibliographie	- 15 -
Annexes	- 16 -

Surveillance des fourmis envahissantes sur les zones à risques du site industriel de PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA, à Prony

RAVARY ECO-CONSULTANT

Mai 2022

Introduction

Le développement des activités humaines représente actuellement la principale menace pesant sur la biodiversité. Outre l'altération des écosystèmes par la destruction des habitats, cause majeure de la disparition des espèces, les activités humaines sont aujourd'hui le principal vecteur du transfert de nombreuses espèces hors de leurs aires d'origine. L'introduction d'espèces exotiques, intentionnelle ou non, est à l'origine d'innombrables invasions biologiques qui se produisent le plus souvent au détriment des espèces locales (Lockwood *et al.* 2007).

Dans le cadre d'un programme de prévention des introductions d'espèces de fourmis envahissantes en Nouvelle-Calédonie, des campagnes d'échantillonnages réguliers sont imposés sur tous les sites sensibles du territoire (ports et aéroports internationaux). Dans le cadre de sa construction et de son exploitation, le site industriel de PRONY RESOURCES NOUVELLE-CALEDONIE reçoit depuis plusieurs années de grandes quantités de matériels et de matériaux directement de l'étranger. En ce sens, certaines zones du site industriel sont considérées comme étant à risque car des fourmis envahissantes peuvent y être accidentellement introduites. C'est ainsi que depuis octobre 2008, des campagnes de surveillance sont réalisées par le cabinet d'expertise BIODICAL (2008-2016) puis RAVARY ECO-CONSULTANT (2017-2022). Les épisodes passés ou récents d'introductions fortuites (Crapaud buffle, Fourmi de Singapour, Mangouste Indienne, Python Réticulé, Grenouille australienne, fourmi-cocktail, *etc.*) survenus sur le sol calédonien illustrent la réalité de ces risques. La plus grande vigilance doit donc être de mise.

Zones concernées par la campagne d'échantillonnage

Cinq zones à risque (cf. Annexe 4) ont été identifiées par le personnel du service Environnement de PRNC (Tableau 1). Le critère principal pour l'identification a été la présence sur ces zones de marchandises, de containers ou de vracs (calcaire, charbon et soufre) importés de l'étranger pour les besoins de l'industriel lors des phases de construction et de démarrage de son usine. L'identification de ces zones a été réalisée au fur et à mesure de la construction et de la mise en service du complexe industriel et de ce fait, toutes n'ont pas bénéficié du même nombre de campagnes de surveillance comme stipulé dans le tableau 1.

Noms des zones	Nombre de campagnes réalisées *	Critères d'identification pour le classement en zone à risque
MAGASIN	27	Docks et aire extérieure de stockage de nombreuses marchandises
VRAC	27	Zones de stockage des vracs (calcaire, charbon, soufre)
STEP	25	Cette zone englobe 4 sous-zones: la station d'épuration, l'ancienne cimenterie Wagner, la parcelle de revégétalisation et l'aire d'entreposage de containers et de marchandises
PORT	28**	Zone du port, Zone de stockage de containers et de matériel
MINE_FPP	17	Zone de stockage de matériel située dans le périmètre d'exploitation

Tableau 1 : Liste des différentes zones à risques pour l'introduction d'espèces de fourmis exogènes sur le site industriel de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie.

(*) celle de mai-juin 2022 incluse. (**) La première campagne a eu lieu sur le Port en septembre 2008.

Protocole utilisé

L'échantillonnage des espèces de fourmis a été réalisé de deux manières : une surveillance par piégeage avec des appâts alimentaires couplée avec une recherche active à vue.

Le piégeage avec des appâts alimentaires

Il consiste à disposer des appâts alimentaires hautement attractifs pour les principales fourmis envahissantes. Cet appât est constitué d'un mélange de miel, de miettes de thon à l'huile et de biscuits écrasés (Human et Gordon 1999). Les appâts sont placés au niveau du sol sur toutes les zones à risque. Ce mélange contenant à la fois des sucres, des lipides et des protéines se révèle très appétant pour un large spectre d'espèces de fourmis et convient parfaitement à ce genre de campagne de détection. Pour chaque station d'échantillonnage, l'équivalent d'une cuillère à café de ce mélange est placé en divers endroits au sol et/ou en hauteur, sur un maillage de 15 mètres sauf dans les zones où le sol est tellement compact qu'il empêche toute installation potentielle de colonies. Une heure après la pose, les appâts sont relevés et les fourmis présentes sont collectées.

Chaque appât est géo-référencé à l'aide d'un récepteur GPS, ce qui nous permet une localisation précise en cas de détection de fourmis envahissantes.

La recherche active à vue

Cette recherche se fait de manière active sur tous les sites potentiels de nidification (planches de bois, plantes, crevasses, etc.).

Collecte et identification des spécimens récoltés

Les ouvrières présentes sur les appâts ont été collectées et placées dans des tubes contenant de l'alcool à 95% pour leur préservation, afin de permettre une identification dans de bonnes conditions en laboratoire sous une loupe binoculaire. Nous utilisons une clé d'identification des fourmis envahissantes dans les îles du Pacifique (<http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/PIAkey/>) afin de pouvoir identifier avec le plus d'exactitude possible les espèces collectées. En cas de doute ou de détection d'une nouvelle espèce introduite, une double identification par un autre expert en la matière doit être réalisée avant de déclencher les mesures de contrôles adéquates.

REMARQUE :

Des techniques de biologie moléculaire permettant l'analyse des séquences hypervariables du génome sont actuellement utilisées de façon routinière par un grand nombre de laboratoires. Afin de confirmer l'identification visuelle des espèces envahissantes ciblées, il est envisageable de développer une méthode de diagnostic robuste basée sur l'amplification de parties spécifiques de leur génome (méthode de la *Polymerase Chain Reaction* ou PCR). Très rapide, un tel test autoriserait l'analyse simultanée d'un grand nombre d'échantillons. Ainsi, dès qu'un test se révèle positif (*i.e.* révélant la présence d'au moins un échantillon contenant l'espèce-cible), la zone de récolte correspondant peut être immédiatement identifiée et une campagne d'échantillonnage plus fine peut alors être mise en place en vue d'un traitement chimique ultérieur.

Dans le cadre de cette surveillance biosécuritaire, les campagnes d'échantillonnage visent en priorité la détection de la fourmi de feu (« Red Imported Fire Ant », RIFA), *Solenopsis invicta*, dont l'impact social, économique et écologique dans les zones d'introduction est considérable. Ainsi, à titre d'exemple, on estime qu'aux Etats-Unis où elle est présente depuis plusieurs décennies, les dégâts causés par cette seule espèce entraînent un coût annuel de 5 milliards US\$ (soit près de 600 milliards FCFP). En Australie, le programme décennal de lutte mis en place contre cette espèce s'élève à plus de \$400 millions (35 milliards FCFP).

D'autres fourmis exogènes à caractère envahissant ayant des impacts négatifs sur l'économie, l'environnement et la santé des pays envahis, telles que la fourmi d'Argentine *Linepithema humile* sont également recherchées.



Solenopsis invicta



Linepithema humile

© Antweb

Résultats

Les résultats bruts des échantillonnages par appâts sont donnés sur un support électronique sous la forme d'un fichier excel: Bdd_fourmis_exo_mai2022.xls

La présente campagne de surveillance s'est déroulée entre le 09 et le 19 mai 2022. Sur les différentes zones prospectées, **2 740 appâts** ont été déposés (Tableau 2, Cartes 1 à 3).

Afin de mettre en évidence les résultats les plus pertinents de notre étude dans le contexte biosécuritaire, nous avons décidé de présenter les taux d'occupations (pourcentages d'occurrence) sous la forme d'une fiche synthétique (ANNEXE 1). Nous avons détaillé les taux d'occupations pour les principales espèces envahissantes détectées sur le site : *Anoplolepis gracilipes*, *Solenopsis geminata*, *Wasmannia auropunctata* et *Pheidole megacephala*. L'évolution des populations de ces espèces est également indiquée en détail sous forme graphique.

Par soucis de clarté, les résultats concernant les autres espèces exogènes qui ne sont pas considérées comme des espèces envahissantes majeures, ont été groupés. Nous avons également groupé les résultats concernant les espèces locales.

Un indicateur spécifique relatif aux fourmis envahissantes (nouvelles pour le territoire ou déjà connue par ailleurs), élaboré sous l'égide de l'Observatoire de l'Environnement (ŒIL), est également présenté.

Cette présentation nous permettra au cours des campagnes ultérieures de mieux appréhender la situation des populations des fourmis envahissantes, l'évolution de leur dominance et les impacts éventuels sur les espèces locales.

Occupation générale des appâts

A l'instar des campagnes précédentes, les taux d'occupation observés diffèrent d'une zone à l'autre. Le facteur principal expliquant ces différences est la nature de l'habitat, notamment la présence ou l'absence de végétation (milieux herbacés, maquis, milieux forestiers et paraforestiers, etc.). Les végétaux fournissent des abris, et plusieurs formes de nourriture comme des nectars, des graines riches en huile et surtout les fourmis y élèvent des insectes (pucerons, cochenille, etc.) producteurs de miellat, un liquide sucré riche en acides aminés. Dans les zones d'habitation, de travail, de détente ou de restauration, les fourmis profitent de notre nourriture et de nos déchets mais également des nombreux insectes et autres invertébrés qui sont attirés dans nos locaux. Lors de cette session, le taux d'occupation des appâts s'est révélé en baisse par rapport aux campagnes précédentes, ce qui s'explique par les effets probables de la sécheresse sévère qui sévit sur le territoire en cette fin d'année, ainsi que par la disparition de nombreux sites de nidification à la suite du nettoyage de certains plateformes de stockage (e.g. STEP).

Tableau 2 : Fréquences d'occupation des appâts

ZONES	Nombre d'appâts déposés	Taux d'occupation		Nombre d'espèces détectées
		N	%	
MAGASIN	528	183	34,7	6
VRAC	378	104	27,5	7
STEP	817	265	32,4	12
PORT	731	344	47,1	9
MINE_FPP	286	99	34,6	6
TOTAL	2 740	995	36,3	15

Diversité et occurrence des espèces détectées

Au total 15 espèces de fourmis ont été détectées sur les 5 zones inventoriées (Tableaux 2&3). Elles appartiennent à 14 genres répartis en 4 sous-familles. Quatre sont des espèces locales et onze sont des espèces introduites, relativement communes dans les milieux anthropisés de Nouvelle-Calédonie.

La majeure partie des espèces locales a été observée dans les zones forestières et para-forestières jouxtant les zones prospectées. Ceci explique pourquoi les zones dévégétalisées situées au sein du site industriel, sont des zones plus pauvres en espèces locales et en fourmis d'une manière générale (cf. Cartes 1 à 3). La diversité des espèces de fourmis locales observées dans ces zones forestières et para-forestières témoignent de l'intérêt écologique de ces milieux. Au cours de ces campagnes, nous portons également un effort particulier à prospecter les zones ouvertes contenant des graminées. Celles-ci sont davantage susceptibles de contenir les espèces envahissantes dont nous craignons l'introduction sur le territoire (i.e. *Solenopsis invicta* et *Linepithema humile*). Au cours de cette campagne, le nombre d'espèces, locales ou exogènes, détectées équivaut à celui des campagnes précédentes, ce qui illustre un effort d'échantillonnage constant d'une campagne à

l'autre. Cette constance nous permet de suivre la progression des populations de fourmis envahissantes et leur impact sur les espèces de fourmis locales.

Parmi les espèces introduites détectées, trois comptent parmi les cinq espèces de fourmis envahissantes les plus néfastes dans le monde : *Anoplolepis gracilipes*, *Pheidole megacephala* et *Wasmannia auropunctata*. La dissémination de ces pestes majeures est à éviter absolument (Holway *et al.* 2002). Une fiche spécifique est consacrée à ces trois pestes, ainsi qu'à l'espèce *Solenopsis geminata*, dont l'impact sur la faune locale est également important (Annexes 2 & 3). On retrouve communément ces espèces introduites dans les milieux perturbés de Nouvelle-Calédonie où elles ont un impact catastrophique sur la diversité des arthropodes dans les milieux naturels qu'elles colonisent.

Tableau 3 : Liste des espèces de fourmis détectées sur le site industriel de Prony Ressources, lors de la campagne de surveillance des fourmis exogènes de mai 2022.

Sous-famille	Espèce	Statut (*)	Présence connue en		Zones prospectées				
			NC	MAGASIN	VRAC	STEP	PORT	MINE	
Dolichoderinae	<i>Iridomyrmex calvus</i>	ELoc	Oui			X		X	
	<i>Leptomymex pallens</i>	ELoc	Oui				X		X
	<i>Tapinoma melanocephalum</i>	EInt	Oui	X			X		
Formicinae	<i>Anoplolepis gracilipes</i>	EInt	Oui				X	X	
	<i>Brachymyrmex obscurior</i>	EInt	Oui	X		X	X	X	X
	<i>Nylanderia vaga</i>	EInt	Oui			X	X	X	
	<i>Paratrechina longicornis</i>	EInt	Oui	X		X	X	X	X
	<i>Polyrhachys guerini</i>	ELoc	Oui				X		X
Myrmicinae	<i>Cardiocondyla wroughtoni</i>	EInt	Oui				X		
	<i>Monomorium floricola</i>	EInt	Oui					X	
	<i>Pheidole megacephala</i>	EInt	Oui	X					
	<i>Pheidole oceanica</i>	EInt	Oui			X	X		
	<i>Solenopsis geminata</i>	EInt	Oui	X		X	X	X	X
	<i>Wasmannia auropunctata</i>	EInt	Oui				X	X	
Ponerinae	<i>Odontomachus cf. simillimus</i>	ELoc	Oui	X		X	X	X	X
Nombre d'espèces par zone				6	7	12	9	6	

(*) : EInt : Espèce Introduite ; ELoc : Espèce Locale (indigène ou endémique).

Les espèces indiquées en rouge sont des pestes majeures en Nouvelle-Calédonie, celles indiquées en vert sont des locales et celles en noir sont des espèces exogènes pas ou peu envahissantes.

Discussion et recommandations

Au terme de cette campagne de surveillance sur le site industriel de Vale Nouvelle-Calédonie à Prony, aucune espèce de fourmi exogène envahissante inédite en NC n'a été détectée. **La fourmi de feu importée *Solenopsis invicta* ainsi que la fourmi d'Argentine *Linepithema humile* sont donc toujours absentes du territoire.**

Indicateur « fourmis envahissantes » (cf. Ravary 2015b)

	Etat du paramètre	Actions de gestion correspondantes
	Aucune espèce envahissante détectée sur le site	R.A.S.
X	Présence de populations anciennes de fourmis envahissantes (FFJ, FE et FNGT)	Délimitation de la zone envahie, mise en quarantaine (cf. Ravary 2013). Si proximité immédiate de zone sensible : protocole d'éradication à envisager
	Détection d'une nouvelle population de fourmi envahissante dont l'espèce (FFJ, FE et FNGT) est par ailleurs déjà connue en NC	Délimitation du périmètre infesté qui devient alors une zone de quarantaine. Mise en place d'un protocole d'éradication.
	Détection d'une espèce envahissante nouvelle pour le territoire	ALERTE : Délimitation immédiate du périmètre infesté, qui devient alors une zone de quarantaine. Mise en place rapide d'un protocole d'éradication.

Les espèces envahissantes présentes

Solenopsis geminata : Malgré quelques fluctuations selon les années, la fourmi de feu tropicale (FFT) reste globalement assez présente sur l'ensemble du site (cartes 1-4), notamment dans les zones où l'abondance de graminées constitue une importante ressource pour ces fourmis granivores (station d'épuration sur STEP, bassins de la zone MAG). En revanche, dans les talus de revégétalisation de la zone du Port où cette espèce était très présente jusqu'en 2014, elle a été depuis remplacée presque complètement par une autre espèce exogène : *Nylanderia vaga* (syn. *Paratrechina vaga*). Il est à noter qu'après ces 7 années, cette dernière espèce

semble en recul dans ce secteur, face à un recrutement très important d'une autre espèce exogène par ailleurs très présente sur tout le site : *Paratrechina longicornis*.

Wasmannia auropunctata : La fourmi électrique (FE), quant à elle, reste présente dans la bordure paraforestière de la zone VRAC ainsi qu'au sein d'un patch paraforestier de la zone STEP et dans une petite dépression littorale du PORT (ces secteurs n'ont pas été spécifiquement inventoriés lors de cette session) (cartes 1-3). Les contours de ces populations n'ont pas été délimités depuis 2015 (Ravary 2015b), on ne connaît donc pas leurs degrés d'expansion depuis cette date, mais elles semblent relativement stables.

Anoplolepis gracilipes : La fourmi folle jaune (FFJ) poursuit sa progression au sein de la zone STEP, notamment à partir du site de l'ancienne cimenterie.

Pheidole megacephala : Malgré l'application d'un traitement chimique par un autre prestataire, la petite population de fourmis noires à grosse tête (FNGT) déjà détectée sur la zone MAG en novembre 2021 est toujours présente (cartes 2). Nous avons décidé d'appliquer immédiatement un traitement à l'AMDRO®. La prochaine campagne de novembre 2022 permettra de vérifier l'efficacité de ce traitement.

Par ailleurs, la population présente sur la Base-Vie a pu être délimitée lors de la session d'avril 2019. Cependant, aucune mesure de gestion n'a été prise depuis, laissant planer le risque que cette espèce envahisse les zones de maquis périphériques, puis les zones forestières proches (forêt Nord) et devienne alors complètement incontrôlable. Il semble urgent de mettre en place un protocole d'éradication avant que cette espèce encore absente des écosystèmes naturels du Grand Sud ne se dissémine hors des limites du site industriel. De plus, il convient également d'alerter les prestataires en charge du démantèlement de la zone, afin qu'ils prennent les précautions d'usage pour ne pas disséminer cette espèce dans des secteurs encore indemnes. Il serait dommage que tous les efforts consentis par l'industriel en matière de biosécurité depuis la mise en place du projet ne soient anéantis par manque de vigilance ou du fait d'une certaine inertie interne.

En conclusion, nous préconisons la poursuite des mesures de biosécurité qui ont été mises en place afin de limiter la propagation de ces espèces, notamment la mise en quarantaine des zones contaminées (proscrire les prélèvements de sol ou de matériaux depuis ces zones), ainsi que la mise en place de programmes de gestion des populations de FE (STEP et PORT), ainsi que la population de FNGT de la Base-Vie (cf. avril 2019).

Fait à Païta le 20 juillet 2022


**CARTE 1 : LOCALISATION DES RELEVÉS MYRMECOLOGIQUES
REALISES SUR LA ZONE STEP (MAI 2022)**

W. auropunctata
(FE)
cf. Ravary 2015b

LEGENDE








- *A. gracilipes* (fourmi folle jaune: FFJ)
- ▲ *W. auropunctata* (fourmi électrique: FE)
- *S. geminata* (fourmi de feu tropicale: FFT)
- ◆ *Ph. megacephala* (fourmi noire à grosse tête: FNGT)
- espèces exogènes pas ou peu envahissantes
- espèces locales
- espèces locales + exogènes

0 100 200 m




CARTE 2 : LOCALISATION DES RELEVES MYRMECOLOGIQUES REALISEES SUR LES ZONES VRAC ET MAGASIN CENTRAL (MAI 2022)

LEGENDE

-  *A. gracilipes* (fourmi folle jaune: FFJ)
-  *W. auropunctata* (fourmi électrique: FE)
-  *S. geminata* (fourmi de feu tropicale: FFT)
-  *Ph. megacephala* (fourmi noire à grosse tête: FNGT)
-  espèces exogènes pas ou peu envahissantes
-  espèces locales
-  espèces locales + exogènes








W. auropunctata
(FE)
cf. Ravary 2013

0 400 800 m



**CARTE 3 : LOCALISATION DES RELEVÉS MYRMECOLOGIQUES
RÉALISÉS SUR LA ZONE DU PORT (MAI 2022)**

LEGENDE

-  *A. gracilipes* (fourmi folle jaune: FFJ)
-  *W. auropunctata* (fourmi électrique: FE)
-  *S. geminata* (fourmi de feu tropicale: FFT)
-  *Ph. megacephala* (fourmi noire à grosse tête: FNGT)
-  espèces exogènes pas ou peu envahissantes
-  espèces locales
-  espèces locales + exogènes

W. auropunctata
(FE)
cf. Ravary 2015b



0 300 600 m



**CARTE 4 : LOCALISATION DES RELEVÉS MYRMECOLOGIQUES
REALISES SUR LA ZONE DE LA MINE_FPP (MAI 2022)**

LEGENDE

- *A. gracilipes* (fourmi folle jaune: FFJ)
- ▲ *W. auropunctata* (fourmi électrique: FE)
- *S. geminata* (fourmi de feu tropicale: FFT)
- ◆ *Ph. megacephala* (fourmi noire à grosse tête: FNGT)
- espèces exogènes pas ou peu envahissantes
- espèces locales
- espèces locales + exogènes



Bibliographie

Holway, D., L. Lach, A. Suarez, N. D. Tsutsui & T. Case (2002). "The Causes and Consequences of Ant Invasions." *Ann. Rev. Ecol. Syst.* 33: 181-233.

Le Breton, J. (2003). Interactions entre la fourmi peste *Wasmannia auropunctata* et le reste de la myrmécofaune. Comparaison de la situation dans une zone envahie: la Nouvelle-Calédonie et dans sa zone d'origine: la Guyane. Thèse de Doctorat. Université Paul Sabatier, Toulouse, 233 p.

Lockwood, J.D., M.F. Hoopes & M.P. Marchetti (2007). *Invasion Ecology.* Blackwell Publishing.

Mattson, L. (2006). Training Manual for the Pacific Island Invasive Ant Surveillance Programme 2005/06. Version 6, 17 May 2006. Agriquality.

Ravary, F. (2013). Délimitation des populations de la fourmi envahissante *Wasmannia auropunctata* présentes en forêt rivulaire, sur le site minier de VALE-NC. Rapport d'expertise pour Vale-NC.

Ravary, F. (2015a). Elaboration d'indicateurs myrmécologiques relatifs aux suivis environnementaux des zones de stockage du site industriel de VALE NOUVELLE-CALÉDONIE. Ed : ŒIL, 39pp.

Ravary, F. (2015b). Délimitations des populations de la fourmi envahissante *Wasmannia auropunctata* présente sur deux zones de stockage du site industriel de Vale NC. Rapport d'expertise pour Vale-NC.

Service Environnement de Goro Nickel (2007). Protocole de surveillance des fourmis envahissantes Port - Usine – Mine. 26 pp.


Annexes

- **Annexe 1:** Fiche synthétique regroupant les principaux résultats obtenus
- **Annexe 2:** Fiche de présentation des principales fourmis envahissantes détectées
- **Annexe 3:** Fiche de présentation des principales fourmis envahissantes détectées
- **Annexe 4:** Cartes des zones échantillonnées

Campagne de surveillance des fourmis exogènes sur les zones à risques du site industriel de PRONY RESSOURCES Nouvelle-Calédonie – mai 2022

Ces campagnes sont réalisées tous les 6 mois depuis septembre 2008. Elles consistent à inventorier la myrmécophage des zones recevant des marchandises de l'étranger et ont pour objectif principal de prémunir la Nouvelle-Calédonie de l'introduction involontaire de nouvelles espèces de fourmis envahissantes nuisibles à son environnement, son économie et la santé de ses habitants. La détection des fourmis est réalisée grâce à l'utilisation d'appâts alimentaires très attractifs. Ces campagnes permettent également de suivre l'évolution des populations de quatre espèces majeures de fourmis envahissantes nuisibles déjà présentes en Nouvelle-Calédonie. Ces quatre espèces sont: la fourmi folle jaune (*Anoplolepis gracilipes*), la fourmi de feu tropicale (*Solenopsis geminata*), la fourmi noire à grosse tête (*Pheidole megacephala*), la fourmi électrique (*Wasmannia auropunctata*). Enfin, la diversité et l'occurrence des espèces locales sont également évaluées.



Au cours de la présente campagne, 2 740 appâts ont été disposés sur 5 zones et 998 d'entre eux (36,4%) ont été occupés par des fourmis. Quinze espèces de fourmis ont été dénombrées, dont onze sont des espèces exogènes. Aucune nouvelle espèce de fourmi envahissante, inédite pour la Nouvelle-Calédonie, n'a été détectée.



MAGASIN (N = 528)

Le grand nombre d'appâts inoccupés s'explique par l'inhospitalité du milieu échantillonné, en particulier l'absence de végétation, et la sécheresse. Ces conditions environnementales particulières couplées à la présence d'espèces exogènes expliquent que très peu d'espèces locales ont été détectées sur ce site. La population de FNGT détectée en novembre 2021 est toujours présente.

Recommandations: Traiter et surveiller cette incursion de FNGT.



La fourmi folle jaune, *Anoplolepis gracilipes*



La fourmi noire à grosse tête, *Pheidole megacephala*



La fourmi de feu tropicale, *Solenopsis geminata*





La fourmi électrique, *Wasmannia auropunctata*



PORT (N = 731)

Ici les pentes des talus recouverts de géotextiles, qui voient le développement de plantes herbacées, offrent des ressources exploitables aux fourmis, en particulier pour le cortège des espèces introduites que l'on retrouve sur une bonne partie du territoire. Deux pestes majeures sont présentes sur la zone (*A. gracilipes* et *W. auropunctata*). Malgré quelques fluctuations, les populations de ces 2 espèces semblent stables. *S. geminata* a été remplacée par une autre espèce exogène: *Nylanderia vaga* (syn. *Paratrechina vaga*), espèce réputée écologiquement moins impactante.



Recommandations: Traiter les populations de FE, (cf. étude Ravary 2015b).



STEP (N = 817)

Les populations des deux espèces envahissantes majeures présentes sur la zone, la fourmi folle jaune et la fourmi électrique, n'ont pas été particulièrement suivie lors de cette session, mais elles sont toujours présentes et poursuivent leur progression. Aucune nouvelle incursion de *P. megacephala* n'a été détectée.


Recommandations: Traiter la population de FE (cf. étude Ravary 2013) et surveiller la population de FFJ.



MINE_FPP (N = 286)

Les colonies de *S. geminata* restent bien présentes sur ce site.



Recommandations: Poursuivre les mesures de biosécurité pour éviter la propagation de *W. auropunctata* située en périphérie: ne pas déplacer de matériaux (déchets verts, topsoil...) depuis cette zone vers d'autres sites encore indemnes de fourmis envahissantes.



VRAC (N = 378)

Cette zone offre peu de ressources aux fourmis, à l'exception de la frange paraforestière longeant la clôture (moins inspectées lors de la présente étude), d'où un taux d'occupation des appâts relativement faible. Deux espèces de fourmis envahissantes sont présentes sur la zone. Après une recrudescence en 2016, la population de *S. geminata* semble se stabiliser. La population de *W. auropunctata* a fait l'objet d'une étude spécifique en vue de l'élaboration d'un plan de gestion éventuel (Ravary 2013).

Recommandations: Se référer à l'étude Ravary 2013 concernant la gestion de cette population de FE.





La faune myrmécologique rencontrée sur la zone prospectée est composée à la fois d'espèces locales et d'espèces exogènes. Mises à part les zones para-forestières et forestières, habitées par des fourmis locales, les zones anthropisées et de maquis sont dominées par les fourmis exogènes. Parmi ces dernières, certaines sont considérées comme très envahissantes et néfastes pour l'environnement: il s'agit par ordre croissant de capacité de nuisance de la fourmi de feu tropicale (*Solenopsis geminata*), de la fourmi folle jaune (*Anoplolepis gracilipes*) et de la fourmi électrique (*Wasmannia auropunctata*).

Les impacts des fourmis envahissantes sur la biodiversité des milieux terrestres calédoniens sont malheureusement sous-estimés car ils ne sont pas visibles directement. Les études scientifiques ont toutefois montré que les milieux fortement envahis sont dépeuplés de la plupart des espèces d'invertébrés locales. Cela a des effets en cascade sur l'ensemble de la chaîne trophique et les populations de reptiles et d'oiseaux ne sont pas épargnées.

La fourmi de feu tropicale, *Solenopsis geminata*


Tout comme la fourmi électrique, *S. geminata* est originaire d'Amérique du Sud. Elles ont également en commun la capacité d'infliger une piqûre douloureuse à quiconque les dérange. La ressemblance s'arrête là car les ouvrières de la fourmi de feu sont bien plus grosses et ne se retrouvent qu'au niveau du sol. Dans les milieux tropicaux, les fourmis de feu sont reconnues pour se multiplier abondamment dans les zones riches en graminées dont elles raffolent de leurs graines riches en huile.

Sur le site industriel de Vale Inco, ses populations sont cantonnées aux milieux ouverts et peuvent être parfois relativement abondantes.



La fourmi folle jaune, *Anoplolepis gracilipes*

Cette fourmi asiatique est très commune sur l'ensemble des zones de maquis du territoire où elle peut atteindre des densités de populations ahurissantes. Ces fourmis nichent au sol mais exploitent activement les ressources présentes sur les végétaux. Ses ouvrières ne possèdent ni aiguillon, ni venin, elles utilisent de l'Acide Formique pour se défendre ou tuer leurs proies. Leur impact est remarquable sur les populations de reptiles et également sur les oiseaux.



La fourmi électrique, *Wasmannia auropunctata*

C'est l'extraordinaire densité des fourmis électriques (près de 90 000 reines par hectares) qui rend cette espèce si compétitive. Les nids occupent toutes les strates, du sol à la canopée et leurs ouvrières entretiennent des relations amicales entre elles ce qui leur confère un avantage décisif.

Reines et leurs oeufs entourés de nombreuses ouvrières à l'intérieur d'un nid de *W. auropunctata*.



Impacts sur la faune



Les fourmis envahissantes sont des chasseuses redoutables. Un puissant venin ou acide couplé à une importante capacité de recrutement leur permet de chasser de très petites et de très grosses proies. Elles agissent comme de véritables aspirateurs de la biodiversité animale des milieux naturels calédoniens.

Dans les milieux envahis, certains groupes d'animaux indigènes voient leurs populations s'effondrer. C'est le cas notamment des fourmis et des araignées. Dans notre contexte insulaire, où les plantes et les animaux ont lentement co-évolué, la disparition de nombreuses espèces d'invertébrés locaux va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème.



Impact sur la flore

Les fourmis envahissantes tirent une grande partie de leur alimentation du miellat sucré produit par les homoptères (insectes suceurs de sève) qu'elles élèvent sur les parties les plus tendres des végétaux. L'état sanitaire des végétaux se dégrade quand les homoptères sont élevés en trop grande quantité. Outre l'affaiblissement et l'inoculation de divers agents phytopathogènes une couche de revêtement mycélien opaque, appelée fumagine, se développe à la surface des végétaux et réduit la capacité de photosynthèse des plantes.

Recommandations

Ces recommandations concernent en priorité la fourmi électrique dont des populations ont été détectées sur différentes zones du site (Port, Vrac et Step) où elle occupe principalement la lisière de milieux paraforestiers.

Etant donné la petite taille des populations détectées nous estimons qu'elles sont d'arrivée récente. Nous rappelons que la dissémination de la fourmi électrique sur des moyennes ou longues distances est surtout le fait d'un transport humain. Ne pratiquant pas de vols nuptiaux, la fourmi électrique colonise de nouveaux milieux de proche en proche, les jeunes reines partent à pied fonder de nouvelles colonies qui gardent le contact avec les colonies mères.

La recommandation principale consiste donc à **contenir les populations détectées** et à **éviter la dissémination de colonies sur d'autres zones du site**. L'expansion de cette espèce dans les zones forestières conduira assurément à une diminution significative de la biodiversité des arthropodes locaux qui y réside actuellement.

ANNEXE 3

L'ESPECE *PHEIDOLE MEGACEPHALA*

DESCRIPTION ET MODE DE VIE

Les soldats possèdent une tête noire et brillante très disproportionnée par rapport à celle des ouvrières minors, d'où le surnom de "Fourmis Noires à Grosses Têtes" attribué à l'espèce.



Soldat de *P. megacephala* (Alex Wild).

TAXONOMIE

La fourmi noire à grosse tête (FNGT) appartient à la sous-famille des Myrmicinae, qui comprend à elle seule 142 genres non-fossiles et plus de 6 000 espèces décrites. Dans cette sous-famille, les fourmis sont souvent munies d'un aiguillon par lequel elles injectent un venin pour se défendre ou neutraliser leurs proies. Cependant, chez les Pheidoles, les ouvrières ont perdu cette faculté et se reposent sur leur grand nombre et leur formidable coopération pour se défendre et chasser. Le genre *Pheidole* est le plus diversifié chez les fourmis puisqu'il comporte à lui seul plus de 1 000 espèces qui présentent toutes deux castes d'ouvrières stériles: les minors et les soldats.

Chez *P. megacephala*, les ouvrières sont de petite taille (environ 2,5 mm), leur corps est élancé, d'une couleur brun-doré et les appendices (pattes et antennes) sont relativement longs. Les antennes sont composées de 12 segments. Les soldats sont plus grands que les ouvrières minors (> 3 mm), et leur tête est très disproportionnée.



COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Le régime alimentaire de la FNGT est très vaste: c'est celui d'une espèce opportuniste consommant toute ressource se présentant à elle. Les apports protéiques, indispensables à la production du couvain, sont constitués en grande partie d'arthropodes chassés ou récupérés morts dans le milieu. Toutefois, l'activité des ouvrières repose sur la consommation de nectars végétaux et de miellats riches en sucres et acides-aminés. Ces substances sont collectées directement dans les nectaires des plantes ou sur les hémiptères suceurs de sève. La FFJ se révèle ainsi très efficace dans l'élevage des pucerons et cochenilles. A: Ouvrières dépeçant un criquet B: Ouvrières collectant du miellat (J Le Breton)



ECOLOGIE

Cette espèce affectionne les endroits humides et ombragés et colonise les habitats perturbés tels que les marges des forêts ou les zones agricoles, notamment les plantations de café, cacao, agrumes. Elle colonise également les zones urbaines où elle devient rapidement une peste domestique.

Les nids se situent généralement dans le sol, à l'intérieur de petites cavités naturelles ou sous de grosses pierres, sous la litière, ou encore à l'intérieur de branches de bambous tombées au sol. L'entrée de ces nids se repère par les amas de matériaux excavés (sable, terre). Elle peut parfois s'installer dans des cavités de troncs d'arbres ou même à l'intérieur des épiphytes poussant dans la canopée. Les ouvrières fourrageuses sont actives jour et nuit, typiquement lorsque les températures sont comprises entre 21 et 35 degrés. En période de fortes pluies ou pendant des sécheresses prolongées, l'activité de fourrage est réduite, voire nulle. La colonie utilise alors la nourriture entreposée dans le nid ou consomme son propre couvain.



Immobilisation d'une intruse (Alex Wild)


L'ESPECE *PHEIDOLE MEGACEPHALA*

DISTRIBUTION – REPRODUCTION – IMPACTS

La structure unicoloniale des populations de la FNGT lui a permis de coloniser avec succès de nombreux territoires qui subissent dorénavant son impact écologique.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

L'origine géographique de la FNGT est africaine. Toutefois, la dispersion déjà très ancienne de cette fourmi par le biais des migrations humaines et des échanges commerciaux, a permis d'élargir considérablement sa distribution actuelle, largement pantropicale et de surcroît en expansion continue (elle est fréquemment détectée dans des containers arrivant dans les ports du monde entier). Accidentellement introduite en Nouvelle-Calédonie dans les années 1950, elle est longtemps restée cantonnée aux milieux urbains, mais depuis quelques années, sa dispersion est rapide et concerne dorénavant les milieux naturels.



REPRODUCTION ET DISPERSION

Les colonies peuvent abriter de nombreuses reines au sein d'un même nid (polygynie) et occuper plusieurs nids simultanément (polycalie). Des échanges de nourriture, mais également des transferts de couvain, de reines et d'ouvrières peuvent se mettre en place entre les différents nids. A l'inverse de nombreuses espèces où les reines fondent seules leur colonie après s'être accouplées lors du vol nuptial, la fondation chez la FNGT est dite « dépendante », c'est-à-dire que les reines nouvellement fécondées quittent leur nid d'origine par voie terrestre, accompagnées par un groupe d'ouvrières. Ce bouturage des colonies et les échanges permanents qui sont maintenus entre les nids favorisent grandement la survie des jeunes reines et donc le succès des nouvelles fondations. Cette structure sociale, dite unicoloniale, peut se développer jusqu'à la formation de "super-colonies" comprenant de nombreux nids interconnectés, dépourvus de frontières territoriales et pouvant s'étendre sur plusieurs centaines d'hectares.



A l'intérieur du nid: couvain (Alex Wild).

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

En zone d'introduction, lorsque ses populations atteignent des densités élevées, la FNGT élimine rapidement les fourmis locales ainsi que de nombreuses « espèces-clés », altérant ainsi en profondeur les écosystèmes. Sa capacité de recrutement importante lui permet de dominer numériquement les ressources et de s'attaquer à des proies plus grosses. De plus, par ses élevages, elle entraîne la pullulation des insectes suceurs de sèves. Le miellat produit alors en excès, induit le développement considérable des moisissures à la surface des arbres, provoquant leur dépérissement. Les proliférations de ces parasites des plantes peuvent s'avérer très néfastes à l'état sanitaire des végétaux en milieu agricole, notamment dans les vergers. La FNGT s'avère également être une peste pour les habitations et infrastructures humaines. Afin d'installer ses nids et de les relier entre eux par des galeries couvertes, elle peut creuser dans les structures en bois, voire même en béton.



Elevage de acicorons (Alex Wild).

ANNEXE 4 : Cartes des zones d'échantillonnage

